

Coordonnées Importantes

Votre nom :

Personne à contacter en cas d'urgence (nom et numéro de téléphone) :

Nom du médecin prescripteur de VENCLYXTO :

Numéro de téléphone du prescripteur :

Version 2.0. Octobre 2023.

abbvie

FR-VNCLL-230041 - 10/2023



Information Importante de Sécurité pour les Professionnels de Santé à propos de VENCLYXTO et du SLT

Ce patient est traité par VENCLYXTO pour une LLC ce qui peut provoquer un Syndrome de Lyse Tumorale (SLT) au cours des 5 premières semaines de traitement.

- ✓ Évaluer les paramètres biochimiques sanguins : potassium, acide urique, phosphore, calcium et créatinine.
- ✓ Corriger immédiatement les paramètres biochimiques sanguins anormaux. **Cela peut être fatal, si non traité.**
- ✓ Si vous suspectez un SLT, contactez immédiatement le médecin prescripteur indiqué sur la carte.

Veuillez consulter le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) ou contacter AbbVie au 0800 00 12 89 pour plus d'informations et si vous avez besoin d'exemplaires supplémentaires de la carte patient



Carte Patient



Information de Sécurité concernant VENCLYXTO (vénétoclax) pour les Patients atteints de Leucémie Lymphoïde Chronique (LLC)

VENCLYXTO est utilisé pour traiter les patients adultes atteints de LLC. Cette carte contient des informations que vous devez connaître sur le Syndrome de Lyse Tumorale (SLT) et VENCLYXTO.



- Gardez toujours cette carte patient avec vous.
- Présentez-la à tout professionnel de santé impliqué dans votre prise en charge ou si vous vous rendez aux urgences.
- Respectez scrupuleusement les consignes fournies par votre médecin pour la prise de VENCLYXTO.

Diffusé sous l'autorité de l'ANSM

Que dois-je savoir sur le SLT ?

Au cours de votre traitement, vous pouvez développer des taux élevés de certains sels dans le sang (tels que le potassium et l'acide urique). Cela peut conduire à une situation appelée Syndrome de Lyse Tumorale (SLT) dans les 5 premières semaines de traitement.

Symptômes du SLT :

- fièvre ou frissons
- nausées ou vomissements
- confusion mentale
- essoufflement
- battements de coeur irréguliers
- urines foncées ou troubles
- fatigue inhabituelle
- douleurs musculaires ou articulations sensibles
- convulsions
- douleur abdominale et ballonnement

Que dois-je faire si j'ai des symptômes de SLT ?

Si vous ressentez des symptômes de SLT pendant votre traitement, vous devez :

- ! **Arrêtez de prendre VENCLYXTO**
et
- ! **Appelez ou consultez immédiatement votre médecin**

Pour accéder à la notice de VENCLYXTO vous pouvez vous rendre sur la base de données publique des médicaments en suivant ce lien ou ce QR code : <https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/>



Comment puis-je réduire mon risque de développer un SLT ?



Boire au moins **1,5 à 2 litres d'eau par jour** :

- En commençant 2 jours avant la 1^{ère} dose, et
- Le jour de votre 1^{ère} dose, et
- Tous les jours pendant les 5 premières semaines de traitement.

Boire beaucoup d'eau aidera à éliminer les taux élevés de sels sanguins par les urines.



N'oubliez pas vos **rendez-vous de prises de sang**, car les résultats aideront votre médecin à identifier un SLT.



Avant votre traitement par VENCLYXTO, votre médecin vous prescrira un médicament pour éviter l'accumulation d'acide urique dans votre organisme.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d'information.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé <https://signalement.social-sante.gouv.fr>.

Pour plus d'information, consulter la rubrique "Déclarer un effet indésirable" sur le site internet de l'ANSM : <http://ansm.sante.fr>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.